

## 「降水確率40%」の意味を知っていますか？ — 確率

これから先の講義では、データの集まりに対して、ここまでで説明した度数分布やその代表値を「推定」する方法を説明します。推定とは、データの集まり全部を調べることができないときに、その一部だけを取り出して、度数分布やその代表値を知る方法です。それを理解するには、どうしても確率の知識が必要ですので、今日は確率のお話です。

「降水確率40%」とは、「現在と同様な天気図のパターンが現れる機会をたくさん想定すると、そのうち40%で雨が降る」という定義になっています。しかし、明日の降水確率が80%だから明日確実に雨が降るわけではなく、また降水確率20%だから明日は雨が降らないわけでもありません。では、確率とは結局何を意味しているのでしょうか？

### 「可能性」の集合

いま、くじをひくと、当たりが出たとします。現実世界では、くじは確かに当たったのであって、それ以外の結果は現れていません。

しかし、われわれは、くじびきとはいつも当たるものではなく、いま現れている「当たり」は偶然による結果だということを知っています。「偶然による」というのは、他の可能性もあった、つまり偶然によって他の結果になるかもしれないなかった、ということの意味をしています。この例の場合ならば、「はずれ」が出るという可能性もあった、ということになります。このような「結果が偶然によって決まる現象」をランダム現象といいます。

統計学の世界では、つねに、この「可能性の集合」を念頭において、考えを進めます。この例の場合ならば、「今は『当たり』という結果が現れたが、『はずれ』が現れる可能性もあった」と考えている、ということなのです。

そして、さらに「どの結果が、どのくらい現れやすいか」を考えます。これを数字で表したのが**確率**です。「現れやすさ」などというものを、どのように数字で表せばよいのでしょうか。ひとつの考え方は、下のようなものです。

**ある結果が現れる確率とは、  
これからその結果が現れる可能性のある 十分多くの回数の機会があるとき、  
そのうち本当にその結果が現れる回数の割合である。**

**次にその結果が現れる確率とは、  
遠い将来までの十分多くの回数の機会を考えて初めて言える「結果の回数の割合」を、  
次の1回の機会にあてはめて述べたものにすぎない。**

例えば、くじ引きを**十分多くの回数**行なうとき、10回に3回の割合で当たりが出るとすれば、「あたりが出る確率」は0.3であると考えます。ただし、次にくじを1回ひくとき、当たりが出るかどうかは何とも言えません。ただ、「これからもくじをひきつづけると、長い目で見れば10回に3回の割合で当たりが出るだろう」という数値で、次の1回の機会での当たりくじの「出やすさ」を表現しようというのが、確率の考え方です。

ギャンブルの例で言えば、プロのギャンブラーは日常的に多くの賭けをし、長い目で見た利益を考え

ていますから、常に確率が大きい方に賭けるほうが有利です。しかし、1回しか賭けをしない人にとっては、「確率が大きい」とことと「次の賭けで勝てる」とことは直接は結びつかないこととなります。

ここでいう「あたりが出る」などの「結果」を、確率論の言葉では**事象**といいます<sup>1</sup>。また、事象が起きる機会、この例ならば「くじを引くこと」を**試行**といいます。また、このような確率の考え方を、**頻度による確率の定義**（統計的確率）といいます。つまり、確率とは「特定の結果がおきる回数の割合」ですから、その値は0から1（0%～100%）の範囲になります。

この意味では、「降水確率 80%」という表現には、意味があります。天気予報には、長い人生で何度も接します。天気予報を信じて、「80%」のときに傘を持っていけば、長い人生の間には、うち80%は「濡れなくてよかったな」、20%は「荷物になったな」となるので、20%のほうはがまんしても、80%の時濡れないほうをとるでしょう。

しかし、一生に1回しかひかないくじで、当たり確率が大きいほうに賭ける意味はあるのでしょうか？ 確率は「長い目で見たとき」の話ですから、1回しかないことで議論しても、その意味はあやしいと思います。

### さいころの各目が出る確率はどれも $1/6$ か？

高校までの教科書で確率を学ぶ時には、「さいころの各目が出る確率は、いずれも  $1/6$  である」ということを前提にしていたと思います。

しかし、頻度による確率の定義から考えれば、次にさいころをふったときにある目が出る確率は、十分に多くの回数さいころを振ってみななければわからないこととなります。しかも、「十分に多くの回数」振らなければなりません、何回なら十分なのでしょう？ 実は、数学でいう「十分に多く」というのは、「誰も文句を言わないくらい多く」という意味であって、何回振っても十分ではないのです。

また、さいころを1万回ふって、そのうち1の目が  $1/6$  の割合で出たとしても、それはあくまで「過去の実績」であって、その次に1万回さいころをふっても、1の目は1回も出ないかもしれません。つまり、頻度による定義では、現実には確率を定めることはできないこととなります。

では、なぜ「さいころの各目が出る確率は、いずれも  $1/6$  である」と言われているのでしょうか？ それは、

1. 各目が同じ確率で出る
2. 各目が出る確率は、いつさいころを振っても同じである

ということを経験者が認めているからです。そこで「さいころには全部で6種類の目があって、いずれの目も常に同じ確率で出るから、各目が出る確率は  $1/6$ 」ということになります。

高校までに習った確率の問題は、このような仮定を認めたうえで、確率すなわち「特定の結果が現れる回数の割合」の問題を、「(さいころの目の種類などの) 可能性のある結果の種類」の問題に置き換えたものです。このような確率の考え方を**ラプラスの定義**（数学的確率）といいます。

しかし、このラプラスの定義も、よく考えるとおかしなところがあります。上で「このような仮定を認めれば」と書きましたが、これが認められるかどうかは、さいころを十分な回数振ってみないとわかりません。これでは堂々めぐりです。

<sup>1</sup>事象には、それ以上分けることのできない「根元事象」と、根元事象の組み合わせでできた「複合事象」があります。詳しくは、教科書 43 ページを参照してください。

つまり、確率の定義にはどのように考えてもあやしいところがあります。確率は、**遠い将来までを長い目で見てはじめて言える「特定の結果が現れる回数の割合」を、次の1回の機会にあてはめて述べたものにすぎません。**また、確率の定義には「十分多くの回数さいころを投げる」という現実には実行不可能な操作や、「各目が同じ確率で出る」という真偽を確かめられない仮定が含まれています。ですから、確率は**測定するものではなく、何らかの仮定をおいて「定義する」もの**なのです。この講義で扱う統計学では、概ね常識的に確率を理解しておけば十分ですが、ここまで述べた確率の「あやしき」は承知しておいてもらいたいと思います<sup>2</sup>。

---

## ルーレット：赤ばかり続いた後は黒が出やすいのか？

ルーレットでは、円盤に配置されている番号のうち、赤のグループに入るものと黒のグループに入るものが半々になっています<sup>3</sup>。ラプラスの定義によれば、「赤と黒がおのおの毎回同じ確率で出る」ことを認めるならば、1回ルーレットを回したとき、赤が出る確率も黒が出る確率も1/2ということになります。しかし、頻度による確率の定義によれば、赤が10回続いたならば、次は黒が出る確率が1/2よりも大きくないと、赤と黒の回数の割合がそれぞれ1/2にならないような気がします。なぜこのような感じがするのでしょうか？

その1つの理由は、前にも書いたことで、10回さいころを振っても10000回振っても「十分な回数」ではない、ということです。赤が10回続いたからと言って、その次にすぐ10回黒が出なければいけないわけではなく、もっともっと長い目でみて赤と黒が半々ならば「赤が出る確率も黒が出る確率も1/2」となります。

2つ目の理由は、次の2つのことを混同しているからです。

1. 赤が10回続けて出れば、次は黒が出やすくなる
2. 「赤が10回続けて出て、次に赤が出る」確率は小さい

「赤と黒がおのおの毎回同じ確率で出る」という仮定を認めるならば、何回赤が続けて出ても、次に赤が出る確率は1/2です。したがって、この仮定を認める限り1. は誤りです。

一方、上の仮定が正しいとしても、赤が2回続けて出る確率は $(1/2) \times (1/2) = 1/4$ 、赤が3回出る確率は $(1/4) \times (1/2) = (1/8)$ で、赤が10回続けて出る確率は $(1/2)^{10}$ すなわち1/1024ですから、さらに赤がもう1回出る確率は1/2048と、とても小さな値になります。ですから2. は正しいということになります。

しかし、このとき「赤が10回続けて出て、次に黒が出る確率」は、赤が10回続けて出る確率が1/1024ですから、さらに黒が1回出る確率もやはり1/2048となります。つまり、2. は「赤が出る確率が1/2で、『赤と黒がおのおの毎回同じ確率で出る』という仮定が正しいならば、『赤が10回続けて出たあとで、次に赤が出る確率』も『赤が10回続けて出たあとで、次に黒が出る確率』も同じで、どちらも小さい」といっているにすぎません。

---

<sup>2</sup>現代の数学では、確率は現実の問題から離れて、集合を測る尺度（測度）のひとつとしてとらえられています。これについては、私の講義「解析応用」で取り扱う予定です。

<sup>3</sup>正確には、色のついていない「0」や「00」があります。

## 確率のパラドックス

次の問題を考えてみましょう。

囚人が3人いて、「A, B, Cの3人のうち、2人は明日処刑される。あとのひとは釈放される。誰が処刑されるかは明日朝発表される」と言い渡されています。以下は、処刑前夜の囚人Aと看守の会話です。

囚人A「看守さんは、明日誰が処刑されるかを知っているそうですね。私が明日処刑されるかどうかを、教えてくれとは言いません。ただ、私以外のB, Cのうち、どちらが処刑されるかを教えてもらえますか？」

看守「本当は言うてはいけないのだが。。。実は、Cは処刑されるのだ。」

囚人A「よく教えてくださいました。これで少し安心しました。」

看守「なぜだ？」

囚人A「看守さんの話を聞く前は、私が処刑される確率は $2/3$ でした。ところが、看守さんにCが処刑されると教えていただきました。ということは、あとは私とBの2人にひとりが処刑されるので、私が処刑される確率は $1/2$ に減りました。」

さて、なにかおかしいと思いませんか？

この問題に答えるポイントは、「『Cが処刑される』という情報は、Aが処刑されるかどうかについての手がかりになるか？」ということです。

実は、看守が同じように「Cは処刑される」と答えても、その答えに至る過程によって、「Aが処刑される確率」は変わってきます。それはなぜか、以下の例で考えてみましょう。

看守が「Cは処刑される」と答えるに至る、以下の3通りの場合を考えます。看守は判決を知っており、その判決は「Bは釈放され、A, Cが処刑される」とであると仮定しましょう。

1. 看守は、「A, B, Cのどれについて答えるか」を確率 $1/3$ ずつで決めるくじをひき、Cについて答えることになったので、「Cは処刑される」と答えた。
2. 看守は、Aについては何も答えないことに決めていたので、BとCのどちらについて答えるかを確率 $1/2$ ずつで決めるコイン投げを行ない、Cについて答えることになったので、「Cは処刑される」と答えた。
3. (問題文と同じ例) 看守は、Bが釈放されることを答えてしまうと、Aが処刑されることを答えるのと同じことになってしまうので、あえてBについては触れず、「Cは処刑される」と答えた。

これらの3通りの例は、いったいどう違うのでしょうか。

1. の場合、看守のくじの結果は「Cについて答える」となりましたが、他に「Aについて答える」「Bについて答える」という結果になる可能性もありました。つまり、

- Cについて答える → Cは処刑 → Aの運命は未定
- Bについて答える → Bは釈放 → Aの処刑が確定

- A について答える → A は処刑 → A の処刑が確定

の3通りの可能性のうち、実際に起きたのはいちばん上のできごとですが、下の2通りが起きるかもしれないなかったわけです。

ここで、「ある事象が起きる確率」とは、「その事象以外にすべての可能な事象を考えて、それらの事象が起きうる試行を十分に多くの回数行なうとき、その特定の事象が起きるような試行の回数の割合」であることを思い出してください。

1. の場合にも、「看守がくじをひく」ことを、仮に十分に多くの回数行なうとしましょう。このときの「起きうる事象」には、上の3通りの可能性があります。ところが、1. の文では、3通りの可能な事象のうち、いちばん上の「くじの結果、Cについて答えると決まった」場合しか考えていません。

ということは、「十分に多くの試行」の回数から、下の2通りの事象が起きた試行を除いたうえで、確率を計算する必要があります。全体の試行の回数が変わりますから、A が処刑される確率も、看守がくじをひく前に比べて変化します<sup>4</sup>。

また、2. の場合、「A については何も答えないことに決めていた」のは確かですが、この場合でも

- C について答える → C は処刑 → A の運命は未定
- B について答える → B は釈放 → A の処刑が確定

の2つの可能性があり、そのうち上の場合しか考えていません。したがって、上の例と同様に、やはりこのコイン投げはA が処刑される確率に影響しています。

ところが、3. の場合、つまり本文の問題文の例では、「Cについて答える」ことは初めから決まっておき、他の可能性はありません。したがって、看守が「Cについて答えた」ことがわかっても、上の説明でいう「十分に多くの試行」の回数は変わりません。したがって、A が処刑される確率も変わらないことになります。つまり、この問題の答は「A が処刑される確率は、看守の言葉を聞いたとしても、依然2/3」ということになります。

このように、実際に看守が「Cが処刑される」と答えたのは同じでも、「他にどのような可能性があったのか」が、確率の計算に影響するのです。このことは、看守の答は同じでも、看守の「癖」や「心の中」が問題になる、ということの意味しています。しかし、心の中を客観的に調べることは、通常はできません。本文の問題文では、看守は、A の運命を答えてしまうことにならないように「Cが処刑される」と答えたと思われませんが、それが本当かどうかは囚人Aにはわかりません。ですから、この問題の答えは、「看守の言うことを信じれば」確率はこうなる、という意味でしかありません。「確率は、測るものではなく、定義するもの」なのです。

上の「看守と囚人」の問題は、「モンティ・ホールのパラドックス (逆説)」として知られているのと同じものです。インターネットで「モンティ・ホール」で検索すると、いろいろな解説が出てきます。

## 今日の演習

プロ野球の日本シリーズの時期になると、「第1試合で勝ったチームが優勝する確率はいくらかくらいである」などといった記事が、スポーツ新聞によく載っています。過去の日本シリーズのうち、第1試合で勝ったチームが優勝した回数の割合をいつているわけですが、これは確率といえるのでしょうか？

<sup>4</sup>この「全体の試行の回数を変える」計算の方法は、「条件付き確率」の計算とよばれています。教科書45～50ページを参照してください。