

2013 年度春学期 応用数学（解析） 第 9 回

演習問題

※ 2011 年度秋学期，2012 年度春学期の試験問題から選んだものです。参考文献からとった問題もあります。

実数の定義・数列の収束に関して

次の各問に答えよ。

1. 「可算無限」とは何かを説明せよ。
2. 数の「稠密性」と「連続性」の違いを説明せよ。
3. 実数の連続性の定義をひとつあげよ。
4. 数列 $a_n = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ は $n \rightarrow \infty$ で 0 に収束することを， $\varepsilon - N$ 論法で示せ。

微分方程式について

関数 $x(t)$ についての次の微分方程式を解け。ただし，初期値が指定されている場合はその初期値を満たす特殊解を，そうでない場合は一般解を求めよ。

1. $x' = \frac{2tx}{t^2 - x^2}$
2. $tx' - x = 1$
3. $tx' - x = x^{\frac{2}{3}}$
4. $x'' + 2x' - 3x = 3t^2 + 2t - 3, x(0) = x'(0) = 0$
5. $x'' + x = \cos 2t, x(0) = x'(0) = 0$

参考文献

水田義弘，詳解演習 微分積分，サイエンス社，1998. ISBN4-7819-0891-8

解答例

実数の定義・数列の収束に関して

1. (講義第2回参照)
2. (講義第3回参照)
3. (講義第3回・第4回であげた4つの定義のうち、ひとつを教えてください。)
4. どんな ε に対しても、 $N = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ (以上の最小の整数) とおくと、 $|a_N| \leq \varepsilon$ となる。よって、 $n > N$ のとき $|a_n - 0| < \varepsilon$ となり、 $\varepsilon - N$ 論法による収束の定義により $n \rightarrow \infty$ のとき $a_n \rightarrow 0$ となる。■

微分方程式について

1. 与式の右辺の分母分子を t^2 で割ると $x' = \frac{2\left(\frac{x}{t}\right)}{1 - \left(\frac{x}{t}\right)^2}$ となるので、同次形の微分方程式である。よって $\frac{x}{t} = u$ とおくと

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= t \frac{du}{dt} + u = \frac{2u}{1 - u^2} \\ t \frac{du}{dt} &= \frac{2u}{1 - u^2} - u = \frac{u(1 + u^2)}{1 - u^2} \\ \frac{1 - u^2}{u(1 + u^2)} du &= \frac{1}{t} dt\end{aligned}\tag{1}$$

$$\int \left(\frac{1}{u} - \frac{2u}{1 + u^2} \right) du = \int \frac{1}{t} dt$$

$$\log |u| - \log |1 + u^2| = \log |t| + C \quad (C \text{ は定数})$$

となり、 $\frac{u}{1 + u^2} = \pm e^C t$ となる。よって、 $\pm e^C$ をあらためて定数 A とおくと、 $\frac{u}{1 + u^2} = At$ が得られる。ここで $u = \frac{x}{t}$ を代入すると、 $\frac{x}{t} = At \left(1 + \left(\frac{x}{t} \right)^2 \right)$ より一般解は $x = A(t^2 + x^2)$ となる。■

2. 与式より $x' - \frac{x}{t} = \frac{1}{t}$ と変形でき、これを1階線型微分方程式の一般形 $x' + P(t)x = Q(t)$ にあてはめると $P(t) = -\frac{1}{t}$, $Q(t) = \frac{1}{t}$ となる。よって、 $p(t) = \exp\left(-\int \frac{1}{t} dt\right) = \frac{1}{t}$ とすると、一般解は C を定数として

$$\begin{aligned}\frac{1}{t}x &= \int \frac{1}{t^2} dt \\ \frac{1}{t}x &= -\frac{1}{t} + C \\ x &= -1 + Ct\end{aligned}\tag{2}$$

となる。■

(すみません、第6回の演習問題と同じでした)

3. 与式は Bernoulli の微分方程式で、その一般形 $x' + P(t)x = Q(t)x^n$ にあてはめると $P(t) = -\frac{1}{t}$, $Q(t) = \frac{1}{t}$, $n = \frac{2}{3}$ である。したがって、 $u = x^{1 - \frac{2}{3}} = x^{\frac{1}{3}}$ とおくと、 $u' + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{t} \right) u = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{t}$ す

なわち $u' + \frac{-1}{3t}u = \frac{1}{3t}$ と変形できる。この方程式は1階線形微分方程式で、 $p(t) = \exp\left(\int \frac{-1}{3t} dt\right)$ とおくと $p(t) = \exp\left(-\frac{1}{3} \log t\right) = t^{-\frac{1}{3}}$ であり、また $(p(t)u)' = p(t)\left(\frac{1}{3t}\right)$ がなりたつことから

$$\begin{aligned}(t^{-\frac{1}{3}}u)' &= t^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{3t} \\ t^{-\frac{1}{3}}u &= \frac{1}{3} \int t^{-\frac{4}{3}} dt \\ t^{-\frac{1}{3}}u &= -t^{-\frac{1}{3}} + C \quad (C \text{ は定数})\end{aligned}\tag{3}$$

よって $u = -1 + Ct^{\frac{1}{3}}$ である。 $u = x^{\frac{1}{3}}$ だったので、一般解は $x = \left(-1 + Ct^{\frac{1}{3}}\right)^3$ となる。■

4. まず与えられた方程式の特殊解を求めるため、 $x = at^2 + bt + c$ と見当をつけて与式に代入すると

$$\begin{aligned}2a + 2(2at + b) - 3(at^2 + bt + c) &= 3t^2 + 2t - 3 \\ -3at^2 + (4a - 3b)t + (2a + 2b - 3c) &= 3t^2 + 2t - 3\end{aligned}\tag{4}$$

が得られる。これが t によらずなりたつので、

$$\begin{cases} -3a & = 3 \\ 4a - 3b & = 2 \\ 2a + 2b - 3c & = -3 \end{cases}\tag{5}$$

がなりたち、これを解くと $a = -1$, $b = -2$, $c = -1$ となる。

一方、対応する斉次形の方程式は $x'' + 2x' - 3x = 0$ で、特性方程式は $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$ であり、その解は $\lambda = 1, -3$ である。よって、斉次形の方程式の一般解は $x(t) = C_1e^t + C_2e^{-3t}$ (C_1, C_2 は任意の定数) となる。

以上から、与方程式の一般解は $x(t) = C_1e^t + C_2e^{-3t} - t^2 - 2t - 1$ となる。

問題での初期値は、 $t = 0$ のとき $x(0) = x'(0) = 0$ となっているので、一般解に代入すると $x(0) = C_1 + C_2 - 1 = 0$, $x'(0) = C_1 - 3C_2 - 2 = 0$ となる。これらから $C_1 = \frac{5}{4}$, $C_2 = -\frac{1}{4}$ となるので、求める特殊解は $x(t) = \frac{5}{4}e^t - \frac{1}{4}e^{-3t} - t^2 - 2t - 1$ である。■

5. 特殊解を求めるため、 $x = A \cos 2t + B \sin 2t$ と見当をつけて与式に代入すると

$$\begin{aligned}(-4A \cos 2t - 4B \sin 2t) + (A \cos 2t + B \sin 2t) &= \cos 2t \\ (-4A + A - 1) \cos 2t + (-4B + B) \sin 2t &= 0\end{aligned}\tag{6}$$

が得られる。これが t によらずなりたつので、 $A = -\frac{1}{3}$, $B = 0$ となる。

一方、対応する斉次形の方程式は $x'' + x = 0$ で、特性方程式は $\lambda^2 + 1 = 0$ となり、その解は $\lambda = \pm i$ である。よって、斉次形の方程式の一般解は $x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ (C_1, C_2 は任意の定数) となる。

以上から、与方程式の一般解は $x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t - \frac{1}{3} \cos 2t$ となる。問題での初期値は、 $t = 0$ のとき $x(0) = x'(0) = 0$ となっているので、一般解に代入すると $x(0) = C_1 - \frac{1}{3} = 0$, $x'(0) = C_2 = 0$ となる。これらから $C_1 = \frac{1}{3}$, $C_2 = 0$ となるので、求める特殊解は $x(t) = \frac{1}{3} \cos t - \frac{1}{3} \cos 2t$ である。■