

分布の平均を推測する — 区間推定

浅野 晃
関西大学総合情報学部



前回までの復習

母平均の推定

母集団
(日本男性全体)

母平均 μ

標本として数値をいくつか取り出して、
それらの平均
[標本平均]

標本平均は母平均に近い値になるか？

母平均が知りたい

が、日本男性全員は調べられない

調べたい集団の、データ全体を調べられるか？


日本男性全員の身長を調べられるか？

データの一部を調べて
度数分布を推測する

統計的推測

いや、せめて平均や分散を推測する

母平均の推定



2020年度秋学期 統計学 / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 5 | 34

母平均の推定

いま1回だけ計算した標本平均も、
おそらく、ほぼ母平均に近い値だろう

どのくらい近い？

どのくらいの確率で？
はずれる確率は？

2020年度秋学期 統計学 / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 6 | 34

正規分布モデル

世の中には、[正規分布モデル]で表せるような母集団分布がたくさんある

長さの測定値の分布
センター試験の成績の分布 …

[中心極限定理]

母集団のばらつきの原因が
無数の独立な原因の和のとき、
母集団分布は概ね正規分布になる

2020年度秋学期 統計学 / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 7 | 34

正規分布の性質1

確率変数 X が $N(\mu, \sigma^2)$ にしたがう とき

$(X - \mu) / \sigma$ は $N(0, 1)$ にしたがう

「標準得点」と同じ

変換しても、
やはり正規分布になる

$N(0, 1)$ を [標準正規分布] という

2020年度秋学期 統計学 / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 8 | 34

正規分布の性質2



区間推定

母平均を推測する。その答え方が、

母平均は、50 から 60 の間にいると推測する。


この推測が当たっている確率は 95% である。

区間推定

標本として数値をひとつだけ抽出
仮に、何度も抽出したとすると


標本の期待値 = 母平均

母平均(実際にはわからない)のまわりにばらついている



区間推定の考え方

数値をいくつか抽出して標本平均
仮に、何度も抽出したとすると



2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 13 | 34


標本平均の左右に区間をつける

どの回の区間が
母平均を含むか・含まないかは
わからないが

確率95%で母平均を含むように
区間を設定できる

区間推定の考え方


区間は母平均を



2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 14 | 34

区間推定の考え方


確率95%で母平均を含むように区間を設定できる



2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 15 | 34

区間推定の考え方

区間は母平均を



実際に、
標本平均と区間は1度しか計算しない


その区間が、母平均を含むかどうかは
実際にはわからない

しかし、確率95%で母平均を含むように
計算した区間だから、
その1回も含むと信じる

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 16 | 34

信頼区間

区間は母平均を



95%という大きな確率で
母平均を含むように設定した区間だから,
その1回でも含むと信じる

母平均の
[信頼係数]95%の
[信頼区間] という
([95%信頼区間])

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野 晃 17 | 34

「信頼」ということば

私は、予言者です。

私の予言は、確率95%で当たります💡


いまから、来年おきることを予言します。「来年は、…」

このひとつの予言が正しいかどうかはわからない

しかし、十分多くの予言をすれば95%は当たるのだから、
この予言も信じる価値はある これが「信頼」

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野 晃 18 | 34

台風情報と信頼区間



2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野 晃 19 | 34

正規分布の場合の 信頼区間の計算

正規分布の場合の区間推定

テキストの例題

ある試験の点数の分布は正規分布であるとします。

この試験の受験者から、10人からなる標本を無作為抽出して、この人たちの点数を平均したところ50点でした。

この試験の受験者全体の標準偏差が5点であるとわかっているとき、受験者全体の平均点の95%信頼区間を求めてください。

正規分布の場合の区間推定

例題

母集団
(受験者全体)

母平均 μ

正規分布
と仮定する

標本 X_1, \dots, X_n をとりだす
サイズ n

標本平均 \bar{X}

母平均 μ の95%信頼区間が知りたい

母分散 σ^2 がわかっているものとする（説明の都合です）

正規分布の場合の区間推定

考え方

標本は、母集団分布と同じ確率分布にしたがう
正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$

標本平均は、やはり正規分布にしたがうが、
分散が $1/n$ になる
[性質2]

正規分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$

正規分布の場合の区間推定

考え方

標本は、母集団分布と同じ確率分布にしたがう
正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$

標本平均は、やはり正規分布にしたがうが、分散が $1/n$ になる
正規分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$ [性質2]

正規分布の[性質1]により

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$$

は標準正規分布にしたがう
 $N(0, 1)$

正規分布の場合の区間推定

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ は標準正規分布にしたがう

標準正規分布の確率密度関数

面積=95%

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ が
この区間にいる確率=95%とすると

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 25 | 34

正規分布の場合の区間推定

面積=95%

面積=2.5%
(左右で5%)

境界の値は?

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 26 | 34

正規分布の場合の区間推定

面積=2.5%

境界の値は「1.96」

うまいぐあいに、正規分布表で

0.06

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
	...									
1.9	0.028717	0.028067	0.027429	0.026803	0.026190	0.025588	0.024998	0.024419	0.023852	0.023295
	0.024998									

1.9

0.024998

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 27 | 34

正規分布の場合の区間推定

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ は標準正規分布にしたがう

標準正規分布の確率密度関数

面積=95%

-1.96 境界の値は 1.96

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ が

この区間にいる確率=95%とすると

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 28 | 34

正規分布の場合の区間推定

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ が -1.96 と 1.96 の間にいる確率が95%

式で書くと

$$P(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \leq 1.96) = 0.95$$

μ の式に直すと

$$P(\bar{X} - 1.96\sqrt{\sigma^2/n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{\sigma^2/n}) = 0.95$$

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 29 | 34

正規分布の場合の区間推定

例題では

標本平均=50 母分散=25

標本サイズ=10

$$P(\bar{X} - 1.96\sqrt{\sigma^2/n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{\sigma^2/n}) = 0.95$$

μ の95%信頼区間の
下限 上限

計算すると、例題の答は
「46.9以上53.1以下」

[46.9, 53.1]

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 30 | 34

信頼区間の考え方

$$P(\bar{X} - 1.96\sqrt{\sigma^2/n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{\sigma^2/n}) = 0.95$$

μ の95%信頼区間の下限 μ の95%信頼区間の上限

計算すると、例題の答は [46.9, 53.1]

これを

$$P(46.9 \leq \mu \leq 53.1) = 0.95$$

と書いてはいけないの？ だめです なぜ？

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 31 | 34

信頼区間の考え方

$P(46.9 \leq \mu \leq 53.1) = 0.95$ と書いてはいけないの？ だめ。


確率の式なのに、()内にランダムなものが
入っていないから

$$P(\bar{X} - 1.96\sqrt{\sigma^2/n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{\sigma^2/n}) = 0.95$$

こう書いたとき、 μ (母平均)はランダムではない
ランダムなのは \bar{X} (標本平均)

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野晃 32 | 34

これを思いだしてください



- 実際には、
標本平均と区間は1度しか計算しない
- その区間が、母平均を含むかどうかは
実際にはわからない
- しかし、確率95%で母平均を含むように
計算した区間だから、
その1回も含むと信じる

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野 晃 33 | 34

区間推定についての注意

$$P(\bar{X} - 1.96\sqrt{\sigma^2/n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{\sigma^2/n}) = 0.95$$

1. 母集団の大きさは関係ない

復元抽出なら、母集団分布は標本抽出によって変化しない

2. 「95%」を選ぶ根拠はない

「確率5%なら、推測がはずれて失敗しても、まあいいか」と思っているだけ

2020年度秋学期 統計学／関西大学総合情報学部 浅野 晃 34 | 34