

2022年度秋学期 応用数学(解析) 第12回
第4部・「その先の解析学」への導入
複素関数論ダイジェスト(1) 複素関数・正則関数

浅野 晃
関西大学総合情報学部



応用数学(解析)は

ここから先の”「その先の解析学」への導入”は,
「ちょっとかっこいい数学」への入口です

複素関数論ダイジェスト(2回)

測度論ダイジェスト(2回)


本来は, それぞれ半期15回をかけて学ぶ科目です🎓
ここでは, 「雰囲気🌫️」を説明します

「複素関数」で
いったい何をやろうというのか🤔

こんな積分は

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx \quad \text{まっとうには求められません。}$$

そこで
数直線を 複素平面に拡張 $z = x + yi$



こういう周C上で
 $\oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz$ を計算すると
上の積分も求まる

複素数と複素関数 🤔

5


複素数と複素関数

複素数 $z = x + yi$ (x, y は実数, $i = \sqrt{-1}$)

実部 虚部

複素数で定義された関数が[複素関数]

複素平面



2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 6 | 25

複素数の指数関数

実数の指数関数のテイラー展開 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

複素数の指数関数は, テイラー展開で定義する

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$$

すると $e^{i\theta} = 1 + \frac{(i\theta)}{1!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \dots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \dots$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i\left(\frac{\theta}{1!} - \frac{\theta^3}{3!} + \dots\right)$$


$\cos \theta$ のテイラー展開 $\sin \theta$ のテイラー展開

よって $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ $\theta = \pi$ のとき $e^{i\pi} + 1 = 0$ [オイラーの等式]

2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 7 | 25

(ところで)テイラー展開について

テイラー展開 $f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$



2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 8 | 25

複素関数と微分 正則関数

9

複素関数の微分

複素関数の微分の定義は、実関数と同様

$$f'(z) = \frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

ただし、変数は複素平面上にあるのが、大きな違い

複素関数 $f(z)$ が、複素平面の領域 D で**[正則]**

→ $f(z)$ が D 内のどこでも**微分可能**

複素平面上で微分可能とは？


2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 10 | 25

複素平面上での「微分可能」

複素関数 $f(z)$ が、複素平面上のある点 z で微分可能とは

$$f'(z) = \frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

複素平面上で $z + \Delta z$ が z にどのように近づいても、極限值はひとつに定まる




どのように近づいても、極限值は同じ

正則関数は、「折り目のないぐにゃぐにゃの板」

2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 11 | 25


正則関数を図示すると



MATLABで描画
参考: <http://jp.mathworks.com/help/matlab/examples/functions-of-complex-variables.html>

2022年度秋学期 応用数学(解析) / 関西大学総合情報学部 浅野 晃 12 | 25

正則でない例



MATLABで描画
参考: <http://jp.mathworks.com/help/matlab/examples/functions-of-complex-variables.html>


コーシー・リーマンの関係式

複素関数 $f(z)$ が正則である必要十分条件は


$z = x + yi$ とするとき

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ と表せるなら

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ かつ} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$



コーシー・リーマンの関係式



$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{u(x + \Delta x, y) + iv(x + \Delta x, y)\} - \{u(x, y) + iv(x, y)\}}{(x + \Delta x) + yi - (x + yi)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\{u(x, y + \Delta y) + iv(x, y + \Delta y)\} - \{u(x, y) + iv(x, y)\}}{(x + (y + \Delta y)i) - (x + yi)} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y} \end{aligned}$$


$$= -i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta y} + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{\Delta y}$$

$$= \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

これらが実部・虚部とも等しい


複素関数の積分

実関数の積分



複素関数の積分

積分区間だけでなく複素平面のどこを**経路**で積分するかが重要



正則関数と積分

複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数 $F(z)$ の微分なら

$$F'(z) = f(z)$$

経路 C が両端 a, b を含めてすべて D 内にあれば

$$\int_C f(z)dz = F(b) - F(a) \quad \text{積分は経路に依存しない}$$

正則関数と積分

複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数 $F(z)$ の微分なら
経路 C が両端 a, b を含めてすべて D 内にあれば

$$\int_C f(z)dz = F(b) - F(a) \quad \text{積分は経路に依存しない}$$

経路 C を $z = z(t)$ で表す 両端は $z(0) = a, z(1) = b$

$$\begin{aligned} \int_C f(z)dz &= \int_0^1 f(z(t)) \frac{dz(t)}{dt} dt \quad (\text{置換積分}) \\ &= \int_0^1 \left(\frac{dF(z(t))}{dz} \frac{dz(t)}{dt} \right) dt \quad (\text{合成関数の微分}) \\ &= \int_0^1 \frac{dF(z(t))}{dt} dt \\ &= F(z(1)) - F(z(0)) = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

閉曲線に沿った積分

さっきの定理

複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数 $F(z)$ の微分なら $F'(z) = f(z)$
 経路 C が両端 a, b を含めてすべて D 内にあれば

$$\int_C f(z)dz = F(b) - F(a) \quad \text{積分は経路に依存しない}$$

ということは、

経路 C が単純閉曲線なら、始点も終点も同じだから

$$\int_C f(z)dz = 0$$

コーシーの積分定理

閉曲線に沿った積分

複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数 $F(z)$ の微分で $F'(z) = f(z)$

経路 C が、 D 内にある単純閉曲線ならば $\int_C f(z)dz = 0$

実は 複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数で
 経路 C が、 D 内にある単純閉曲線ならば

注:
 「領域内で正則」であって、
 「経路上で正則」ではない

$$\int_C f(z)dz = 0 \quad \text{【コーシーの積分定理】}$$

示唆しているのは 正則関数の微分は正則関数
 正則関数は何度でも微分できる
 (証明の概略に、次回で少し触れます)

$\oint_C f(z)dz$
 閉曲線上の積分を表す

コーシーの積分定理

コーシーの積分定理 複素関数 $f(z)$ が、領域 D での正則関数で
 経路 C が、 D 内にある閉曲線ならば $\oint_C f(z)dz = 0$

証明は、グリーンンの定理で

$$\oint_C (Pdx + Qdy) = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad \text{線積分と面積分を交換}$$

2次元関数

閉曲線 C 上での(線)積分 閉曲線 C に囲まれた領域 D' 内での(面)積分

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ として

$$\begin{aligned} \oint_C f(z)dz &= \oint_C \{u(x, y) + iv(x, y)\}(dx + idy) \\ &= \oint_C (udx - vdy) + i \oint_C (vdx + udy) \\ &= \iint_{D'} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_{D'} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

正則関数なので、コーシー・リーマンの関係式よりどちらもゼロ

今日のまとめ

複素関数

複素数の指数関数

複素関数の微分 → 「正則関数」

複素関数の積分 (経路に沿った積分)

コーシーの積分定理

領域内で正則な関数を、
 領域内の閉曲線に沿って積分すると0

正則でない点を囲んで積分したら？

次回に向けて

正則でない点を囲んで積分したら？

