2026年度秋学期

統計学

第9回
確からしさを記述する
— 確率



関西大学総合情報学部
浅野 晃

標本調査と確率

分布全体を調べるのではなく，一部だけ（標本）を調べる

それで分布全体のようすがわかるのか？

わかります。かなりの程度わかります。

標本を選ぶのに，くじびきで選ぶ（無作為抽出）

くじびきで選べば，たいていはいろんな人がまんべんなく選ばれる

たまには「まんべんなくない」のか？

はい。ただ，その「たまには」の確率を求められます。

「確率」って，よく聞くけれど🤔

※「確立」という書き間違いを見ると，かなりがっかりします😞

※中国語では「概率」あるいは「機率」というそうです

「降水確率40%」って？

何の割合が40%？

機会
現在と同じ気象状況が
これから何度も何度も起きるとすると
そのうち40%の場合で雨になる

機会のうちの雨の割合が40%

可能性の集合

くじびき

※この機械は「新井式廻轉抽籤器」というそうです（リンク参照）



https://illpop.com/png_season/dec01_a07.htm

↓くじをひくと

当たった！

現実に起きたのは，
これだけ

他のことは起きていない

可能性の集合

しかし



当たった

他の可能性もあった

はずれ　当たり　はずれ

こうなるかも知れなかった

「偶然」（人知が及ばない）

［ランダム現象］という

可能性の集合

現実　可能性



当たった

はずれ　当たり　はずれ

可能性のうち
どの結果になりやすいか？

を，数値で表せないか？
（ギャンブラーの数学）

「確率」の定義💡

頻度による確率の定義

あるできごとがおきる確率は，
［事象］event

そのできごとがおきる可能性のある，十分多くの機会があるとき，
［試行］trial
それらの機会のうち，そのできごとがおきる機会の数の割合

くじを十分多くの回数ひくとき，10回中3回の割合で当たるなら，確率0.3
十分多くの人がそれぞれ1回くじをひくと，10人中3人の割合で当たる，でも同じ

※確率は「割合」なので，「大きい・小さい」と表現します。「高い・低い」なのは「可能性」です。

頻度による確率の定義

あるできごとがおきる確率は，

そのできごとがおきる可能性のある
十分多くの機会があるとき，
おかしな点（1）　おかしな点（2）

それらの機会のうち
そのできごとがおきる機会の数の割合

確率の定義・おかしな点（1）

「十分多くの機会」？

数学でいう「十分多く」とは，

だれかが「十分ではない」といったら，
それに応じていくらでも多くすること
ことができる，　ということ

現実には無理😵

確率の定義・おかしな点（2）

機会が「ある」とき？

機会が「あった」ではない

つまり，未来におきるできごとの話をしている。

未来のことはわからない。

確率は測定できないけれど

「十分多くの機会」は現実には無理

未来のことはわからない　　人間の思考の限界？🤔

でも

過去を未来に延長できると考える　　（「自然の斉一性」）

十分多くは無理でも，
「そこそこ多く」の機会があれば　　［大数の法則］
そこそこの精度で確率を推定できる

というわけで確率は

「十分多くの機会」に関する話を，次の1回の機会にあてはめている

ギャンブラーは，
日常的に賭けをしているから，
確率の大きなできごとを見抜いて賭ければ，
全体として勝つことができる

どんな名ギャンブラーでも，1回の賭けに
必ず勝つことはできない

もうひとつの確率の定義🤔

さいころで1が出る確率

なぜ1/6なのか？

$$\frac{\text{「1」は1通り}}{\text{1, 2, 3, 4, 5, 6の6通り}} = 1/6$$

確率の［ラプラスの定義］という

さっきの「頻度による定義」とは違う…🤔

ラプラスの定義の意味

$$\frac{\overset{n\text{ 回}}{\text{「1」は1通り}}}{\underset{n\text{ 回}}{\text{1, 2, 3, 4, 5, 6の6通り}}} = n/(6n) = 1/6$$

1～6が皆同じ確率で出る，と認めるなら，
「同様に確からしい」 equally likely

さいころを $6n$ 回ふる。(n は十分大きい)

n が十分大きければ，1～6は同じ回数出る(頻度による定義)

ラプラスの定義の意味

1～6が皆同じ確率で出る，と認めるなら
「同様に確からしい」

正しいと証明する方法はない

このさいころは偏っていないだろうという
「信頼」によって認めているだけ

条件付き確率と独立🤔

統計学でいう「独立」とは

2つのランダム現象がおきるとき，一方の結果がもう一方に影響しない



2度続けてひくとき，

1度めで出た玉を戻さなければ，独立でない

1度めで当たりが出ると，
2度めは当たりが減っている

正確には[条件付き確率]を使って定義する

条件付き確率

「雨が降る確率」
「雨の予報が出ているときに雨が降る確率」← ふつう，こちらの方が大きい

条件付き確率とは，

何かがおきたときに
何かがおきるとわかったときに　　別のことがおきる確率
何かがおきるのが確実なときに

「何か」がおきることの影響を受けることがある
（「何か」と「別のこと」に因果関係がなくても）

さいころの例で

集合を表す「ベン図」を使って考える

さいころの「可能な目」は，1,2,3,4,5,6



集合と確率

集合 X の要素の数を $|X|$ で表す

「3以下の目が出る確率」

$$\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{3}{6}$$

$P(A)$ で表す

「偶数の目が出る確率」

$$\frac{|B|}{|\Omega|}=\frac{3}{6}$$

$P(B)$ で表す



集合と確率

「3以下で，かつ偶数の目が出る確率」

$$\frac{|A\cap B|}{|\Omega|}=\frac{1}{6}$$

$P(A\cap B)$ で表す

3以下でかつ偶数の目の集合
$A\cap B$ で表す



この式は何を表す？

$$\frac{|A \cap B|}{|B|}$$

分母が Ω ではなく B

「可能なすべての目」は，Ω ではなく B になった



条件つき確率

$$\frac{|A \cap B|}{|B|}$$

分母が Ω ではなく B

「可能なすべての目」は，Ω ではなく B になった

偶数の目が出るとわかっているときに

「3以下かつ偶数（わかってます）」の目が出る確率

偶数が出ることを条件とする，
3以下が出る[条件つき確率]



$P(A \mid B)$ で表す

条件つき確率

「3以下の目が出る確率」

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

偶数が出ることを条件とする，
3以下が出る条件つき確率

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

「偶数が出る」という情報によって，
3以下が出る確率が変化した



「2以下の目」だったら

「2以下の目が出る確率」

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

偶数が出ることを条件とする，
2以下が出る条件つき確率

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

つまり $P(A) = P(A \mid B)$



「独立」

「2以下の目が出る確率」

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

偶数が出ることを条件とする，
2以下が出る条件つき確率

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

つまり $P(A) = P(A \mid B)$

2以下が出る確率は，「偶数が出る」という情報によっても，変化しない

$P(A) = P(A \mid B)$ のとき「事象 A と事象 B は独立」という

A と B が独立＝「B が起きる」ことがわかっても，A が起きる確率には影響がない

確率の積の法則

B を条件とする，A の条件つき確率

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

$$= \left(\frac{|A \cap B|}{|\Omega|} \right) / \left(\frac{|B|}{|\Omega|} \right)$$

$$= P(A \cap B) \,/\, P(B) \ )$$

つまり

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$$



確率の積の法則

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \times P(B)$$

A と B の両方が起きる確率

とりあえず B が起きるものとして，そのときに A が起きる確率

ところで，B が本当に起きる確率

A と B が独立のときは，$P(A \mid B) = P(A)$ だから

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

A と B が独立のときだけ，こうなることに注意

※勝手に独立にしてはいけません。

モンティ・ホール問題

モンティ・ホール問題

モンティ・ホール氏が司会するテレビ番組

箱が3つあり、ひとつだけに賞品がある。
ゲストが箱をひとつ選ぶ►が，まだ開けない

モンティは賞品のありかを知っている。
彼は「ゲストが選ばなかった空箱」を1つ開けて



モンティ・ホール問題

👴💬

「いまなら，さっき選んだ箱ではなく，
まだ開けていないもう1つの箱を選んでもかまいません」

選ぶ箱を変えるほうが，当たる確率が大きくなるか？



答えは

ゲストが選ぶ箱を変えないと，当たる確率 1/3
箱を変えると，当たる確率 2/3

箱は残り2つだから，当たる確率は，
箱を変えても変えなくても 1/2 じゃないの？

※違います。「勝手に同確率」にしてはいけません。

もっとも簡単な説明

箱をA,B,Cとし，ゲストがAを選んだとする

賞品が　Aにある確率　1/3
「BまたはC」にある確率　2/3

モンティが開けるのは必ず空の箱 → 上の確率は，
箱を開けても変わらない



本当に正しいか？

賞品が　Aにある確率　1/3　　この確率は，
「BまたはC」にある確率　2/3　箱を開けても変わらない

本当か？

「モンティは，賞品がある箱は開けない」



本当に正しいか？

「モンティは，賞品のある箱は開けない」

賞品がBにあるなら，Cしか開けられない
賞品がCにあるなら，Bしか開けられない　　他に可能性はない

「BまたはCにある確率2/3」は，　箱を開けても変わらない



確率が変化する
場合とは👉

もし「裏ルール」があったら

「モンティは，賞品のある箱は開けない」
　賞品がAにあるときは？　モンティはB,Cのどちらを開けてもよい

もしも「賞品がAにあるときは，必ずBを開ける」という
裏ルールがあったら？

モンティがBを開けたら，賞品はAにあるという確信が高まる



実はモンティが…

「モンティは，賞品のある箱は開けない」
　モンティが，↑これを守っていなかったら？

モンティは，実はA,B,Cを同じ確率でランダムに選んでおり，
今回たまたまCを開けたら空だった，としたら

賞品がA,Bにある確率が平等に大きくなる



条件付き確率で
考えてみる👉

条件付き確率を考える

モンティは，実はA,B,Cを同じ確率でランダムに選んでおり，
今回たまたまCを開けたら空だった，としたら

当初，Aに賞品がある確率を$P(A)$，
Cに賞品がない確率を$P(\bar{C})$ とすると

モンティがCを開けたあとにAに賞品がある確率は
「モンティがCを開けて空だったという条件のもとで，
Aに賞品がある条件付き確率」$P(A \mid \bar{C})$

$$P(A \mid \bar{C}) = \frac{P(A \cap \bar{C})}{P(\bar{C})}$$

実はモンティが…

「モンティは，実はA,B,Cを同じ確率でランダムに選んだ」のならば
Aに賞品がある確率 $P(A) = \frac{1}{3}$ ，Cに賞品がない確率 $P(\bar{C}) = \frac{2}{3}$ なので

モンティがCを開けたあとにAに賞品がある確率は

賞品がAにあってCにない確率

$$P(A \mid \bar{C}) = \frac{P(A \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(A)}{P(\bar{C})} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}$$



この問題のポイントは

モンティの行動は，賞品のありかを知る手がかりになっているか？

確率とは「すべての可能性の数のうち，着目している可能性の割合」
つまり，モンティの行動が「他にどんな可能性があったか」によって
確率は変わる

それには，モンティの「心の中」が影響します。

